



皮肤性病备战中级考试大全

(1) 2007 年皮肤考试试题

2007 年皮肤科相关专业知识及皮肤科专业实践能力和专业部分题目

- 1 落麻疹的主要病理表现：真皮水肿
- 2 毛囊角化病的主要病理表现：角化不良细胞
- 3 下列哪种疾病有色素失禁：扁平苔藓
- 4 驯行疹的病原体：猫，狗所携带钩虫的幼虫
- 5 下列哪种疾病为火激红斑：长期红外线照射局部
- 6 AIDS 的诊断目前主要靠检测：抗原？抗体？
- 7 疥疮为何夜间痒的严重？
- 8 蜂窝织炎的致病菌？
- 9 丹毒的致病菌？
- 10 麻疹病毒在什么情况下能生存？A 通风 B 热 C 低温 D 紫外线
- 11 色素息肉综合症是什么类型遗传病？常染色体显性遗传
- 12 表皮常驻菌？表皮葡萄球菌
- 13 面部化妆品过敏属于几型变态反应？
- 14 皮肌炎的主要临床
- 15 结节性痤疮，囊肿性痤疮首选哪种维 A 酸口服？
- 16 寻常性痤疮首选哪种维 A 酸外用？
- 17 糖皮质激素由肾上腺皮质哪个部位分泌？
- 18 糖皮质激素对血液系统的影响？红细胞，中性粒细胞，血小板，红细胞上升
- 19 按作用时间的长短，糖皮质激素的分类？长效，短效，中效
- 20 MTX 的长期主要副作用？肝脏纤维化
- 21 环孢素的主要副作用？肾毒性
- 22 以下哪种属于遮光剂？氢醌
- 23 面部皮炎有渗出应该选用哪种剂型？溶液
- 24 日光性皮炎的致病光谱？290—320nm
- 25 红细胞生成性原卟啉病对哪个波段的紫外线最敏感？400NM
- 26 下列哪项是错误的？挪威疥疮是由疥疮的挪威种引起的
- 27 腋毛癣的致病菌是？微细棒状杆菌
- 28 获得性大疱性表皮松解性药疹的机理？
- 29 萎缩纹是由于什么病变引起的？弹性纤维
- 30 黄褐斑是由于什么引起？口服避孕药
- 31 Rihel 黑变病由什么引起？接触沥青
- 32 以下哪种虫咬可分泌强酸，而且需要包扎近心端？蝎子

- 33 肥大性瘢痕与瘢痕疙瘩的区别?
- 34 白化病是由于什么引起? 黑素合成障碍
- 35 白癜风发病机理? 黑素细胞受到破坏
- 36 以下哪项是错误的? HIV 的 POL 基因编码逆转录病毒的结构蛋白, gag env 基因编码逆转录酶与整合酶 其实正好相反
- 37 性病性淋巴肉芽肿由什么病原体引起? 沙眼衣原体 L1 L2 L3
- 38 生殖器疱疹可检测到? HSV 2 型的
- 39 以下哪种结构不出现在面部? 透明层
- 40 淋球菌主要寄生在? 移行上皮与柱状上皮
- 41 下列哪项疾病没有明显季节性? 丘疹行荨麻疹, 隐翅虫皮炎, 头虱, 驯行疹,
- 42 下列哪项正确? 色素息肉综合症的黑子部位, 大小, 分布与胃肠病无关
- 43 新生儿红斑狼疮的标记性抗体? RO/SSA
- 44 混合结缔组织病的抗核抗体?
- 45 手足癣的最常见致病菌? 红毛癣
- 46 以下哪项是正确的? 甲癣常继发于其他癣病及外伤
- 47 冻疮发生时哪种血管最先收缩? 小动脉
- 48 以下哪项是错误的? 蠕虫皮炎常发生于春天
- 49 种痘样水疱病的特点有一题
- 50 放线菌病首选什么药物?
- 51 氢醌是脱色剂
- 52 皮肤卟啉病对光敏感度? 是 400

6月二号下午皮肤科机考专业实践能力考题

病例分析: 共 11 题

- 1 梅毒
- 2 黄褐斑
- 3 银屑病
- 4 SWEET 病
- 5 疥疮
- 6 糖尿病皮肤病
- 7 鳞癌
- 8 天疱疮
- 9 过敏性紫癜
- 10 大疱表皮松解性药疹
- 11 带状疱疹

机考的题目看起来虽然不难, 但因为大部分都是多选, 所以选起来还是比较难的, 70 分以上的好像不是很多, 所以希望大家好好看书, 不要存在侥幸心理。

2007 年 6 月二号下午皮肤科专业知识题目

- 1: 皮肤淀粉样变性
- 2: sezary 综合征
- 3: 嗜酸性粒细胞增多症的诊断标准

2007 年皮肤主治医师考试的题目（补充）

- 1 驰行疹致病虫？
- 2 SLE 所致肾炎类型？
- 3 莱姆病的病理表现？
- 4 结节性红斑的病理表现？
- 5 莱姆病的主要病理表现？真皮水肿
- 6 毛囊角化病的主要病理表现：角化不良细胞
- 7 下列哪种疾病有色素失禁：扁平苔藓
- 8 驰行疹的病原体：猫，狗所携带钩虫的幼虫
- 9 下列哪种疾病为火激红斑：长期红外线照射局部
- 10 AIDS 的诊断目前主要靠检测：抗原？抗体？
- 11 疥疮为何夜间痒的严重？
- 12 蜂窝织炎的致病菌？
- 13 丹毒的致病菌？
- 14 麻疹病毒在什么情况下能生存？A 通风 B 热 C 低温 D 紫外线
- 15 色素息肉综合症是什么类型遗传病？常染色体显性遗传
- 16 表皮常驻菌？表皮葡萄球菌,糠秕孢子菌
- 17 丹毒的病因？
- 18 麻风 TT BT BB BL LL 免疫强弱(就是结核菌素试验)
- 19 麻风 BT 皮审？
- 20 蒲皮炎主要发生季节？
- 21 软下疳主要临床表现？
- 22 性病性淋巴肉芽肿病因？
- 23 AIDS 的主要病因？
- 24 火激红斑主要病因
- 25 青霉素过敏的病因？ 1 2 3
- 26 自身抗原的改变方向？ 无细菌

皮肤科机考专业实践能力考题 病例分析：共 11 题

- 1 梅毒
- 2 黄褐斑
- 3 银屑病
- 4 SWEET 病
- 5 疥疮
- 6 糖尿病皮肤病
- 7 鳞癌
- 8 皮肤淀粉样变
- 9 过敏性紫癜
- 10 大疱表皮松解性药疹
- 11 带状疱疹

(2) 2008 年皮肤考试题目

基础知识及相关专业知识

- 1 激光脱毛作用机理? A 破坏毛囊 B 破坏毛囊和小汗腺 C 破坏毛囊和大汗腺
- 2 挪威疥是以下说法错误? A 由挪威种疥虫引起严重疥疮 B 又称角化性疥疮 C 常见卫生差及营养不良者
- 3 变态反应性接触性皮炎是几型?
- 4 色素失禁是哪些细胞受损?
- 5 桥粒芯糖蛋白 1 是哪种疱病抗原?
- 6 口周-肠黑子综合征是哪种遗传?
- 7 维生素 PP 指中 PP 指什么?
- 8 天疱疮发生机制?
- 9 SEZARY 细胞形态相似细胞是什么?
- 10 长波紫外线最深能达到哪层?
- 11 和巴西天疱疮有关昆虫是? 黑蝇
- 12 坤角化最常转化为哪种癌?
- 13 腹股沟肉芽肿病原体是?
- 14 REITER 病治病体是?
- 15 圆体指什么? 毛囊角化病的组织病理检查中的角化不良细胞, 位于棘层和颗粒层, 中央为嗜碱性固缩的核
- 16 胶样小体指什么?
- 17 抗 RNP 抗体几乎 100% 阳性, 且高滴度是哪种结缔病?
- 18 巴西天疱疮的病因? 黑蝇
- 19 紫外线照射最深部位是哪 表皮 真皮
- 20 皮的常住菌是? 表皮葡萄球菌 类白喉杆菌
- 21 经典性病是? 软下疳
- 22 皮肤脂质的成分?
- 23 Pautrier 脓肿见于什么病?
- 24 外毛根鞘, 内毛根鞘, 结缔组织鞘由内至外的顺序?
- 25 正常汗液的 PH? 4.5-5.5
- 26 Pacini 小体属哪种感觉受体? 压觉
- 27 毛发的生长期\休止期多长?
- 28 属多烯类的抗真菌药? 两性霉素
- 29 没有毛发的部位?
- 30 甲的生长区?
- 31 促进中性粒细胞趋化的因子?
- 32 自身免疫的机制?
- 33 DSG1 3 抗体所致的病? 落叶/寻常型天疱疮
- 34 HLA 复合体 I 类基因区是指什么?
- 35 毛发的分布?
- 36 哪些激素含氟元素, 哪些激素半衰期最长?

- 37 白色念珠菌病常见类型?
- 38 皮肤的厚度? 0.5-4mm
- 39 TZANCK 细胞见于那个病 ?
- 40 隐球菌的墨汁染色?
- 41 阴虱虫分泌毒素的性质 ? 强酸性
- 42 汗孔角化证易癌变的类型?
- 43 自身免疫性疾病病因, 抗体等?
- 44 孢子丝菌病常见类型?
- 45 口腔粘膜斑的病理表现?
- 46 表皮痣的病理?
- 47 乳房外 PAGET 病好发? 大汗腺分布
- 48 黑素细胞和多少个基底细胞相连? 36
- 49 成人皮肤总面积: 1.5-2.0 平方米
- 50 成人皮肤总个体重量: 16%
- 51 毛发生长期: 3-4 年; 休止期: 3 月
- 52 人体毛发分为: 粗毛和毳毛
- 53 男性脱发与什么有关? 顶泌汗腺青春期分泌旺盛
- 54 甲的生长区: 甲母质
- 55 不是皮肤附属器的是: 立毛肌
- 56 青光眼禁用的药物有: 赛庚啶
- 57 口唇单纯疱疹的病原体是: HSV-I
- 58 手癣的常见病原菌: 红毛癣菌
- 59 麻风杆菌的形态特点?
- 60 腹股沟肉芽肿的病原菌? IL-1, 2, 3
- 61 冷冻治疗疣体的原理?
- 62 天疱疮的发病机理?
- 63 有关激光治疗的适应症?
- 64 真皮基质中的粘多糖主要是什么?
- 65 SLE 的特异性抗体? Sm dsDNA
- 66 第三代维 A 酸的药物是哪种?
- 67 麻风的诊断要点?
- 68 结节病受累的器官不包括什么? 肾上腺
- 69 毛发红糠疹的特征性发病部位? 四肢伸侧及指背具特征性的毛囊角化性丘疹
- 70 淋病潜伏期 ? 2-10 天, 平均 3-5 天
- 71 特应性皮炎诊断标准的英文名称? Williams 标准
- 72 毛发的生长区? 毛基质

相关专业知识

1. 溃疡的定义?
2. 不是皮肤触诊的内容? 同形反应
3. 不是肉芽肿的是? 银屑病
4. 抗组胺药嗜睡的原因? 易通过血脑屏障
5. 服用阿司咪唑体重增加的原因? 食欲增加

6. 痤疮的好发年龄？15-30岁
7. 与痤疮无关的因素？低脂饮食
8. 维生素 PP 又名？烟酸
9. 手足口病病原菌？柯萨奇病毒
10. 水痘的病原菌？VZV
11. 没有毛发的部位？
12. 医患关系的实质？现代医生义务：全心全意为人民身心健康服务
13. 维 A 酸的不良反应
14. 颜面播散性粟粒性狼疮的诊断和治疗（考核中我搞错了）
15. 麻疹
16. 红斑狼疮
17. 角化棘皮瘤
18. 湿疹
19. Reiter 病

专业实践

1. 梅毒二期
2. 脓疱性银屑病
3. 扁平苔藓
4. 生殖器疱疹
5. 混合结缔组织病
6. 淋病
7. 寻常型天疱疮
8. 表皮松懈性药疹
9. 风疹

（3）皮肤中级考试的题型

B1 型题

以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

（1~2 题共用备选答案）

A. 青霉素

- B. 红霉素
- C. 四环素
- D. 螺旋霉素
- E. 甲砜霉素

- 1. 梅毒首选治疗为答案 ABCDE
- 2. 性病性肉芽肿首选治疗为答案 ABCDE

显示答案 正确答案:1. A; 2. B

(3~7 题共用备选答案)

- A. 由雌激素、糖皮质激素、卤素等所致
- B. 接触石油、焦油等
- C. 痤疮，突然显著加重，伴有发热等全身症状
- D. 表现为严重的结节、囊肿、窦道、瘢痕
- E. 与月经密切相关
 - 3. 药物性痤疮答案 ABCDE
 - 4. 月经前痤疮答案 ABCDE
 - 5. 聚合性痤疮答案 ABCDE
 - 6. 职业性痤疮答案 ABCDE
 - 7. 暴发性痤疮答案 ABCDE

显示答案 正确答案:3. A; 4. E; 5. D; 6. B; 7. C

(8~10 题共用备选答案)

- A. 粉剂
- B. 酊剂或醑剂
- C. 硬膏
- D. 溶液
- E. 以上均不是
 - 8. 急性或亚急性皮炎而无渗液者可选用答案 ABCDE
 - 9. 急性皮炎伴大量渗液或脓性分泌物者可选用答案 ABCDE
 - 10. 慢性局限性浸润肥厚性皮肤病者可选用答案 ABCDE

显示答案 正确答案:8. A; 9. E; 10. C

(11~12 题共用备选答案)

- A. Kogoj 微脓肿
- B. 棘层变薄
- C. Pautrier 微脓肿
- D. 毛细血管扩张，真皮水肿
- E. 颗粒层减少

11. 脓疱型银屑病的病理特点答案 ABCDE

12. 寻常型银屑病的病理特点答案 ABCDE

显示答案 正确答案:11. A; 12. E

(13~15 题共用备选答案)

A. HSV-I

B. HSV-II

C. HPV

D. HIV

E. HBV

13. 引起寻常疣的病原体通常是答案 ABCDE

14. 引起口腔单纯疱疹的病原体通常是答案 ABCDE

15. 引起尖锐湿疣的病原体答案 ABCDE

显示答案 正确答案:13. C; 14. A; 15. C

(16~17 题共用备选答案)

A. I型变态反应

B. 原发性刺激反应

C. 接触性致敏反应

D. 光毒性反应

E. 过量反应

16. 强酸、强碱引起的接触性皮炎为答案 ABCDE

17. 香料引起的接触性皮炎为答案 ABCDE

显示答案 正确答案:16. B; 17. C

(18~20 题共用备选答案)

A. 瘙痒症

B. 慢性单纯性苔藓

C. 湿疹

D. 夏季皮炎

E. 扁平苔藓

18. 临幊上仅有瘙痒症状而无原发性皮肤损害的皮肤病答案 ABCDE

19. 临幊上瘙痒剧烈，急性期以丘疱疹为主，有渗出倾向，慢性期以苔藓样变为主，常反复发作答案 ABCDE

20. 以阵发性剧痒及皮肤苔藓样变为特征的慢性炎症性皮肤病答案 ABCDE

显示答案 正确答案:18. A; 19. C; 20. B

(21~24 题共用备选答案)

- A. 瓷白色萎缩性斑片
 - B. 紫蓝色多角形扁平丘疹
 - C. 角化性脱屑斑丘疹
 - D. 针尖大小丘疹，周围绕以红晕
 - E. 手足部手套袜套样剥脱
21. 痒子可见答案 ABCDE
22. 银屑病可见答案 ABCDE
23. 硬化萎缩性苔藓可见答案 ABCDE
24. 扁平丘疹可见答案 ABCDE

显示答案 正确答案:21. D; 22. C; 23. A; 24. B

A3 型题

以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(1~3 题共用题干)

某患者因肺炎住院输液治疗 2 天后全身泛发鲜红斑风团、瘙痒

- 1. 最可能的诊断
 - A. 急性荨麻疹
 - B. 痘疹
 - C. 细菌疹
 - D. 药疹
 - E. 皮炎
- 2. 最常见引起荨麻疹的药物
 - A. 吗啡
 - B. 青霉素
 - C. 磺胺制剂
 - D. 链霉素
 - E. 口服利尿药
- 3. 治疗冷性荨麻疹以下哪种药物最有效
 - A. 扑尔敏
 - B. 仙特明
 - C. 开瑞坦
 - D. 赛庚啶
 - E. 酮替芬

显示答案 正确答案:1. D; 2. B; 3. D

(4~6 题共用题干)

患者，38岁，晨起后发现左季肋区有群集性小疱，伴瘙痒和疼痛。

4. 最可能的诊断

- A. 胸膜炎
- B. 胆囊炎
- C. 肋软骨炎
- D. 流行性肌痛
- E. 带状疱疹

5. 上述病例的疗程一般为

- A. 3天
- B. 5天
- C. 7天
- D. 10天
- E. 两周

6. 该病人皮损消失后可能会留有

- A. 色素沉着
- B. 疱疹后神经痛
- C. 瘢痕
- D. 神经功能障碍
- E. 畸形

显示答案 正确答案:4. E; 5. C; 6. B

(7~9题共用题干)

患者原有痤疮，突然显著加重，伴有发热等全身症状

7. 最可能的诊断

- A. 职业性痤疮
- B. 药物性痤疮
- C. 暴发性痤疮
- D. 寻常性痤疮
- E. 月经前痤疮

8. 不应给予的治疗药物

- A. 维A酸类
- B. 抗生素药物
- C. 锌制剂
- D. 中药
- E. 溴碘类

9. 治疗痤疮外用药不包括以下哪类

- A. 青霉素类
- B. 维A酸类
- C. 硫化硒
- D. 过氧化苯甲酰
- E. 红霉素类

显示答案 正确答案:7. C; 8. E; 9. A

(10~11题共用题干)

患者女性，25岁，过去在小腿及足部有湿疹样病变，由于过度搔抓而出现红肿、糜烂、渗液等，原发病灶附近有多数散在的小丘疹，丘疱疹及水疱，皮损相互融合成片，对称分布，部分发展为有糠状鳞屑的椭圆形红斑，瘙痒剧烈。

10. 该病人的鉴别诊断不包括

- A. 药疹
- B. 玫瑰糠疹
- C. 传染性湿疹样皮炎
- D. 湿疹
- E. 体癣

11. 对上述病人的治疗较重要的是

- A. 局部用药
- B. 糖皮质激素
- C. 抗组胺药
- D. 处理原发病
- E. 10%葡萄糖酸钙

显示答案 正确答案:10. E; 11. D

(12~15题共用题干)

患者，男，68岁，右侧胸背部疼痛一周，皮疹3天，查体可见右侧胸背部数片红斑基础上呈簇水疱，排列成带状

12. 可能的诊断是

- A. 丹毒
- B. 脓疱疮
- C. 传染性软疣
- D. 带状疱疹
- E. 类天疱疮

13. 以下治疗不正确的是

- A. 局部治疗以干燥、消炎为主
- B. 对于一般患者，以止痛、缩短病程和防止继发感染为原则
- C. 早期可使用糖皮质激素
- D. 干扰素、丙种球蛋白、胸腺肽等对本病都有效
- E. 本病的治疗以口服抗生素为主

14. 有关本病的叙述正确的是

- A. 患者一定曾患水痘
- B. 患者需经常清洗皮疹处以防继发感染
- C. 患者需绝对消毒隔离
- D. 局部理疗可缓解疼痛，提高疗效
- E. 如病情加重，皮疹可明显累及左侧胸背部

15. 1月后，患者皮疹完全消退，但仍觉右侧胸背部疼痛难忍，最可能的原因是

- A. 肩周炎

- B. 心绞痛
- C. 带状疱疹后遗神经痛
- D. 痛病
- E. 椎间盘突出

显示答案 正确答案:12. D; 13. E; 14. D; 15. C

(16~18 题共用题干)

女性，30岁，双手、足心可见对称性红斑上成群淡黄色针头至粟粒大小脓疱。反复发作5年。掌部初发于大小鱼际，后渐扩展至掌心。部分脓疱已经干涸、结痂及脱屑，鳞屑下反复出现成群新疱。

- 16. 本病分型属于
 - A. 寻常型银屑病
 - B. 脓疱型银屑病
 - C. 关节型银屑病
 - D. 红皮病型银屑病
 - E. 泛发型银屑病
- 17. 本病的病理不可能是
 - A. 角化不全伴角化过度
 - B. 颗粒层变薄
 - C. 棘层变薄
 - D. 表皮突规则下延
 - E. kogoj 微脓肿
- 18. 下列哪项与本病无关
 - A. 遗传
 - B. 外伤
 - C. 高血压
 - D. 精神紧张
 - E. 免疫

显示答案 正确答案:16. B; 17. C; 18. C

(19~20 题共用题干)

某幼儿，4岁，在躯干出现多个绿豆大小、略呈纺锤形的红色风团样的丘疹，有的皮损有伪足，顶端有水疱，内容清，周围无红晕，幼儿自诉剧痒。

- 19. 最可能的诊断是
 - A. 蕁麻疹
 - B. 水痘
 - C. Hebm 痒疹
 - D. 丘疹性蕁麻疹
 - E. 传染性软疣
- 20. 该病的特点是
 - A. 成人较多
 - B. 无瘙痒

- C. 一般无全身表现
- D. 五色素沉着
- E. 与季节无关

显示答案 正确答案:19. D; 20. C

(21~24 题共用题干)

患者，双前臂、双手背红斑基础上散在粟粒大小丘疹、丘疱疹及点状糜烂面，有明显浆液性渗出，边界不清，皮疹对称分布，自觉瘙痒剧烈

- 21. 最可能的诊断是
 - A. 药疹
 - B. 慢性单纯性苔藓
 - C. 神经性皮炎
 - D. 急性湿疹
 - E. 脓疱疮
- 22. 下列外用药物中选用哪种最为合适
 - A. 炉甘石洗剂
 - B. 油剂
 - C. 溶液湿敷
 - D. 气雾剂
 - E. 软膏
- 23. 应嘱患者的注意事项中错误的是
 - A. 发病期间避免辛辣食物及酒类
 - B. 有鱼虾过敏者，忌食鱼虾
 - C. 勤洗浴，以防继发感染
 - D. 避免各种可疑的致病因素
 - E. 避免各种外界刺激，如搔抓等
- 24. 经上述外用药物治疗一周后，红肿、渗液消失，此时的外用药选择下列哪项最合适
 - A. 继续使用原外用药不变，直至皮疹完全消退
 - B. 煤焦油制剂
 - C. 糖皮质激素软膏或糊剂
 - D. 角质剥脱剂
 - E. 硬膏

显示答案 正确答案:21. D; 22. C; 23. C; 24. C

(25~27 题共用题干)

患者，男，25岁。尿道口脓性分泌物3天。已婚，5天前不洁性接触史。性伴侣及爱人情况不详。查体：尿道口红肿，深黄色脓性分泌物，腹股沟淋巴结肿大，触痛。尿道分泌物涂片，革兰染色，镜下可见大量多形核白细胞，细胞内可见数量不等的革兰阴性双球菌

- 25. 本病诊断首先考虑
 - A. 淋病

- B. 滴虫性尿道炎
 - C. 尖锐湿疣
 - D. 梅毒
 - E. 艾滋病
26. 做此病原菌培养最好在
- A. 排尿后
 - B. 陈旧尿内
 - C. 排尿后 1~2 小时
 - D. 尿道外口要用强力杀菌剂消毒后
 - E. 用转送的培养基取材
27. 如此病原菌属耐青霉素菌株的感染，首选药物是
- A. 壮观霉素
 - B. 红霉素
 - C. 四环素
 - D. 氟哌酸
 - E. 螺旋霉素

显示答案 正确答案:25. A; 26. C; 27. A

(28~31 题共用题干)

患者男性，67岁，自觉双下肢胫前皮肤瘙痒一年余，以夜间为重，近两天来因进食辛辣食物症状加重，双胫前皮肤可见抓痕、血痴，局部皮肤肥厚，苔藓化

28. 诊断以下哪种疾病的可能性大
- A. 慢性单纯性苔藓
 - B. 湿疹
 - C. 老年性瘙痒症
 - D. 线状苔藓
 - E. 寻常性鱼鳞病
29. 你认为以下哪种检查对于寻找原发病因意义最小
- A. 测空腹血糖
 - B. T3、T4
 - C. 心脏彩超
 - D. 肝胆 B 超
 - E. 肾功能检查
30. 你认为以下哪项治疗方案最不可取
- A. 口服抗组胺药
 - B. 使用性激素治疗可能有一定疗效
 - C. 根据病情选用含止痒剂的炉甘石洗剂、皮质激素软膏和霜剂
 - D. 局部用药前应先用热水肥皂洗清皮肤
 - E. 口服镇静催眠药
31. 你认为还应叮嘱该患者的注意事项
- A. 注意生活规律，少进烟酒及辛辣食物
 - B. 尽量避免搔抓
 - C. 避免外界的各种刺激

- D. 洗浴不用碱性过强的肥皂及热水
- E. 以上均是

显示答案 正确答案:28. C; 29. C; 30. D; 31. E

(32~34 题共用题干)

患者男性，28岁，右前臂可见大片红斑，其上可见针头至粟粒大小丘疱疹，有明显浆液性渗出，诊断为急性湿疹

32. 以下哪种治疗方法最为合适

- A. 溶液湿敷
- B. 粉剂
- C. 软膏
- D. 硬膏
- E. 酊剂

33. 若此患者经过上述治疗红肿及渗出减轻但仍有丘疹及少量丘疱疹可选用

- A. 溶液湿敷
- B. 粉剂
- C. 软膏
- D. 硬膏
- E. 酊剂

34. 若此患者经久不愈，发展为慢性湿疹，查体可见患部皮肤肥厚，表面粗糙呈苔藓化，可选用

- A. 溶液湿敷
- B. 粉剂
- C. 软膏
- D. 硬膏
- E. 酊剂

显示答案 正确答案:32. A; 33. C; 34. D

(35~37 题共用题干)

男性，50岁，患皮肤病十余年，反复发作，累及全身。躯干及四肢伸侧分布大小不一的红斑，绿豆大小，斑片状，肘、膝、腰、骶尾部更为明显，皮损边界清楚，红斑表面覆有分层云母样鳞屑；鳞屑易剥除，下方呈发亮淡红色薄膜状及点状出血。头皮皮损表面有较厚鳞屑，头发成束。手足甲呈凹陷点，甲床肥厚

35. 本病分型属于

- A. 寻常型银屑病
- B. 脓疱型银屑病
- C. 关节型银屑病
- D. 红皮病型银屑病
- E. 泛发型银屑病

36. 刮去薄膜现象出现出血点，又称为

- A. Gottron 征

- B. Auspitz 征
 - C. CREST 综合征
 - D. Ramsay-Hunt 综合征
 - E. Stevens-Johnson 综合征
37. 针对该患者病情，哪种药物为禁用药物
- A. 糖酸莫米松软膏
 - B. 维 A 酸制剂
 - C. 维生素 D3 衍生物
 - D. 角质促成剂
 - E. 糖皮质激素

显示答案 正确答案:35. A; 36. B; 37. E

(38~40 题共用题干)

患者男性，40岁。全身起红斑、手足心起褐色斑点1周，不痛、不痒。患者于2个月前阴茎包皮远端至冠状沟处曾起一指甲盖大暗红色结节，不痛，自行破溃，外用红霉素眼药膏3周后愈合。近1周来躯干、四肢相继出现红斑，双手、足心出现豆大褐色斑，不痒。曾服抗过敏药物治疗无效。原无手足癣史。近1个月来无全身用药史。已婚，发病前3个月左右有夜游史。性伴侣及爱人情况不清。体检：躯干、四肢可见泛发云豆、蚕豆大淡红斑，表面无脱屑，压之退色；双手、双足掌跖处散发云豆大褐色角化斑，表面有少量脱屑。阴茎末端包皮与冠状沟联接处可见一指甲盖大瘢痕。右侧腹股沟可触及一个直径2cm大小的淋巴结，无压痛。生殖器其他部位、肛门、口腔未见异常

38. 本病诊断首先考虑
- A. 淋病
 - B. 药疹
 - C. 银屑病
 - D. 梅毒
 - E. 玫瑰糠疹
39. 本病治疗首选
- A. 青霉素
 - B. 红霉素
 - C. 四环素
 - D. 螺旋霉素
 - E. 甲砜霉素
40. 下列哪种化验为本病的确证试验
- A. VDRL
 - B. USR
 - C. RPR
 - D. ART
 - E. TPHA

显示答案 正确答案:38. D; 39. A; 40. E

(41~43 题共用题干)

男，25岁。尿道口脓性分泌物3天。已婚，5天前不洁性接触史。性伴侣及爱人情况不详。查体：尿道口红肿，深黄色脓性分泌物，腹股沟淋巴结肿大，触痛。尿道分泌物涂片，革兰染色，镜下可见大量多形核白细胞，细胞内可见数量不等的革兰阴性双球菌

41. 该病诊断首先考虑

- A. 淋病
- B. 滴虫性尿道炎
- C. 尖锐湿疣
- D. 梅毒
- E. 艾滋病

42. 做此病原菌培养最好在

- A. 排尿后
- B. 陈旧尿内
- C. 排尿后1~2小时
- D. 尿道外口要用强力杀菌剂消毒后
- E. 用转送的培养基取材

43. 如此病原菌属耐青霉素菌株的感染，首选药物是

- A. 大观霉素(壮观霉素)
- B. 红霉素
- C. 四环素
- D. 氟哌酸
- E. 螺旋霉素

显示答案 正确答案:41. A; 42. C; 43. A

(44~47题共用题干)

男，67岁，右侧胸背部疼痛一周，皮疹3天，查体可见右侧胸背部数片红斑基础上呈簇水疱，排列成带状

44. 可能的诊断是

- A. 丹毒
- B. 脓疱疮
- C. 传染性软疣
- D. 带状疱疹
- E. 类天疱疮

45. 以下治疗不正确的是

- A. 局部治疗以干燥、消炎为主
- B. 对于一般患者，以止痛、缩短病程和防止继发感染为原则
- C. 早期可使用糖皮质激素
- D. 干扰素、丙种球蛋白、胸腺肽等对该病都有效
- E. 该病的治疗以口服抗生素为主

46. 有关该病的叙述正确的是

- A. 患者一定曾患水痘
- B. 患者需经常清洗皮疹处以防继发感染
- C. 患者需绝对消毒隔离

- D. 局部理疗可缓解疼痛，提高疗效
- E. 如病情加重，皮疹可明显累及左侧胸背部

47. 1个月后，患者皮疹完全消退，但仍觉右侧胸背部疼痛难忍，最可能

的原因是

- A. 肩周炎
- B. 心绞痛
- C. 带状疱疹后遗神经痛
- D. 痛病
- E. 椎间盘突出

显示答案 正确答案:44. D; 45. E; 46. D; 47. C

(48~51题共用题干)

双前臂、双手背红斑基础上散在粟粒大小丘疹、丘疱疹及点状糜烂面，有明显浆液性渗出，皮疹对称分布，自觉瘙痒剧烈

48. 最可能的诊断是

- A. 药疹
- B. 慢性单纯性苔藓
- C. 神经性皮炎
- D. 急性湿疹
- E. 脓疱疮

49. 下列外用药物中选用哪种最为合适

- A. 炉甘石洗剂
- B. 油剂
- C. 溶液湿敷
- D. 气雾剂
- E. 软膏

50. 应嘱患者的注意事项中错误的是

- A. 发病期间避免辛辣食物及酒类
- B. 有鱼虾过敏者，忌食鱼虾
- C. 勤洗浴，以防继发感染
- D. 避免各种可疑的致病因素
- E. 避免各种外界刺激，如搔抓等

列哪项最合适

- A. 继续使用原外用药不变，直至皮疹完全消退
- B. 煤焦油制剂
- C. 糖皮质激素软膏或糊剂
- D. 角质剥脱剂
- E. 硬膏

显示答案 正确答案:48. D; 49. C; 50. C; 51. C

(52~54题共用题干)

男，27岁，右前臂可见大片红斑，其上可见针头至粟粒大小丘疱疹，有明显浆液性渗出，诊断为急性湿疹

52. 以下哪种治疗方法最为合适

- A. 溶液湿敷
- B. 粉剂
- C. 软膏
- D. 硬膏
- E. 酊剂

53. 若此患者经过上述治疗红肿及渗出减轻但仍有丘疹及少量丘疱疹可选用

- A. 溶液湿敷
- B. 粉剂
- C. 软膏
- D. 硬膏
- E. 酊剂

54. 若此患者经久不愈，发展为慢性湿疹，查体可见患部皮肤肥厚，表面粗糙呈苔藓化，可选用

- A. 溶液湿敷
- B. 粉剂
- C. 软膏
- D. 硬膏
- E. 酊剂

显示答案 正确答案:52. A; 53. C; 54. D

(55~57题共用题干)

男，40岁。全身起红斑、手足心起褐色斑点1周，不痛、不痒。于2个月前阴茎包皮远端至冠状沟处曾起一指甲盖大暗红色结节，不痛，自行破溃，外用红霉素眼药膏3周后愈合。近1周来躯干、四肢相继出现红斑，双手、足心出现豆大褐色斑，不痒。曾服抗过敏药物治疗无效。原无手足癣史。近1个月来无全身用药史。已婚，发病前3个月左右有夜游史。性伴侣及爱人情况不清。体检：躯干、四肢可见泛发云豆、蚕豆大淡红斑，表面无脱屑，压之褪色；双手、双足掌跖处散发云豆大褐色角化斑，表面有少量脱屑。阴茎末端包皮与冠状沟联接处可见一指甲盖大瘢痕。右侧腹股沟可触及一个直径2cm大小的淋巴结，无压痛。生殖器其他部位、肛门、口腔未见异常

55. 该病诊断首先考虑

- A. 淋病
- B. 药疹
- C. 银屑病
- D. 梅毒
- E. 玫瑰糠疹

56. 该病治疗首选

- A. 青霉素
- B. 红霉素
- C. 四环素

- D. 螺旋霉素
 - E. 甲砜霉素
57. 下列哪种化验为该病的确证试验
- A. VDRL
 - B.USR
 - C. RPR
 - D. ART
 - E. TPHA

显示答案 正确答案:55. D; 56. A; 57. E

(58~61 题共用题干)

男，66岁，自觉双下肢胫前皮肤瘙痒1年余，以夜间为重，近2天来因进食辛辣食物症状加重，双胫前皮肤可见抓痕、血痴，局部皮肤肥厚，苔藓化

58. 诊断以下哪种疾病的可能性大
- A. 慢性单纯性苔藓
 - B. 湿疹
 - C. 老年性瘙痒病
 - D. 线状苔藓
 - E. 寻常性鱼鳞病
59. 以下哪种检查对于寻找原发病因意义最小
- A. 测空腹血糖
 - B. T3、T4
 - C. 心脏彩超
 - D. 肝胆B超
 - E. 肾功能检查
60. 以下哪项治疗方案最不可取
- A. 口服抗组胺药
 - B. 使用性激素治疗可能有一定疗效
 - C. 根据病情选用含止痒剂的炉甘石洗剂、皮质激素软膏和霜剂
 - D. 局部用药前应先用热水肥皂洗清皮肤
 - E. 口服镇静催眠药
61. 还应叮嘱该患者的注意事项
- A. 注意生活规律，少进烟酒及辛辣食物
 - B. 尽量避免搔抓
 - C. 避免外界的各种刺激
 - D. 洗浴不用碱性过强的肥皂及热水
 - E. 以上均是

显示答案 正确答案:58. C; 59. C; 60. D; 61. E

(62~64 题共用题干)

某患者，聚餐食入大量鱼虾，同时饮酒，半小时后全身多发鲜红色风团，发生和消退均较快，伴瘙痒、腹痛、呼吸困难

62. 最可能的诊断

- A. 药疹
- B. 急性胰腺炎
- C. 急性荨麻疹
- D. 痢疾
- E. 胃肠炎

63. 立即给予哪项治疗

- A. 口服抗组胺药
- B. 皮下注射 0.1% 肾上腺素 0.5ml、吸氧
- C. 阿托品等解痉药
- D. 抗生素控制感染
- E. 通便利尿

64. 不应给予

- A. 口服抗组胺药
- B. 皮下注射 0.1% 肾上腺素 0.5ml、吸氧
- C. 抗生素控制感染
- D. 外用炉甘石洗剂
- E. 口服皮质激素

显示答案 正确答案:62. C; 63. B; 64. C

(65~66 题共用题干)

男, 52岁, 患皮肤病 10 余年, 反复发作, 累及全身。躯干及四肢伸侧分布大小不一的红斑, 绿豆大小, 斑片状, 肘、膝、腰、骶尾部更为明显, 皮损边界清楚, 红斑表面覆有分层云母样鳞屑; 鳞屑易剥除, 下方呈发亮淡红色薄膜状及点状出血。头皮皮损表面有较厚鳞屑, 头发成束。手足甲呈凹陷点, 甲床肥厚

65. 该病分型属于

- A. 寻常型银屑病
- B. 脓疱型银屑病
- C. 关节型银屑病
- D. 红皮病型银屑病
- E. 泛发型银屑病

66. 针对该患者病情, 哪种药物为禁用药物

- A. 糜酸莫米松软膏
- B. 维 A 酸制剂
- C. 维生素 D3 衍生物
- D. 角质促成剂
- E. 糖皮质激素

显示答案 正确答案:65. A; 66. E

(67~68 题共用题干)

女, 26岁, 近半月来皮肤抓后隆起条状红斑风团, 越抓越多, 越起越痒。

67. 拟诊断为

- A. 急性荨麻疹
 - B. 胆碱能性荨麻疹
 - C. 寒冷性荨麻疹
 - D. 慢性荨麻疹
 - E. 人工荨麻疹
68. 荨麻疹单个风团从起到消退的时间一般为
- A. 3~4 天
 - B. 1~2 天
 - C. 很少超过 24 小时
 - D. 5~7 天
 - E. 8 天以上

显示答案 正确答案:67. E; 68. C

(69~71 题共用题干)

女，32 岁，双手、足心可见对称性红斑上成群淡黄色针头至粟粒大小脓疱。反复发作 5 年。掌部初发于大小鱼际，后渐扩展至掌心。部分脓疱已经干涸、结痂及脱屑，鳞屑下反复出现成群新疱。

69. 该病分型属于
- A. 寻常型银屑病
 - B. 脓疱型银屑病
 - C. 关节型银屑病
 - D. 红皮病型银屑病
 - E. 泛发型银屑病
70. 该病的病理不可能是
- A. 角化不全伴角化过度
 - B. 颗粒层变薄
 - C. 棘层变薄
 - D. 表皮突规则下延
 - E. 微脓肿
71. 下列哪项与该病无关
- A. 遗传
 - B. 外伤
 - C. 高血压
 - D. 精神紧张
 - E. 免疫

显示答案 正确答案:69. B; 70. C; 71. C

A1 型题

每一道考试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题

卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 不属于特殊类型荨麻疹的是

- A. 丘疹型荨麻疹
- B. 皮肤划痕症
- C. 寒冷性荨麻疹
- D. 压迫性荨麻疹
- E. 日光性荨麻疹

显示答案 正确答案:A

2. 关于股癣正确的是

- A. 中间无自愈倾向
- B. 无自觉表现
- C. 无传染性
- D. 发生于阴囊部位时常呈对称性
- E. 皮损可呈古钱币形

显示答案 正确答案:E

3. 扁平疣的病原体

- A. 双链 DNA 病毒
- B. 单链 DNA 病毒
- C. RNA 病毒
- D. 副黏病毒
- E. 核病毒

显示答案 正确答案:A

4. Koebner 现象见于

- A. 寻常狼疮
- B. 寻常疣
- C. 跖疣
- D. 扁平疣
- E. 尖锐湿疣

显示答案 正确答案 😊

5. 湿疹症状的特点是

- A. 多形性皮疹，有渗出倾向，对称分布，瘙痒明显，易复发
- B. 皮疹为风团，发生及消退迅速，消退后不留痕迹
- C. 四肢伸侧为主，轻痒，伴银白色脱屑
- D. 以脱屑为主，开始即有苔藓化表现，痒明显
- E. 皮损局限于某一部位，边界清楚，痒不明显，有局限性

显示答案 正确答案:A

6. 银屑病中最重的一型是

- A. 寻常型

- B. 泛发型脓疱型
- C. 关节病型
- D. 局限性脓疱病型
- E. 红皮病型

显示答案 正确答案:B

7. 关于水痘和带状疱疹治疗的说法哪项正确

- A. 由同一病毒致病
- B. 抵抗力低下时产生水痘
- C. 抵抗力强时发生带状疱疹
- D. 愈后均留瘢痕
- E. 无获得性免疫力

显示答案 正确答案:A

8. 蠕虫抗原皮内试验有利于诊断

- A. 蠕皮炎
- B. 蠕形螨病
- C. 毛虫皮炎
- D. 丘疹性荨麻疹
- E. 慢性荨麻疹

显示答案 正确答案:☺

9. 可防止银屑病复发的药物是

- A. 糖皮质激素
- B. 维A酸
- C. 免疫抑制剂
- D. 蒸林软膏
- E. 目前尚无

显示答案 正确答案:E

10. 关于传染性软疣的说法不正确的是

- A. 多见于儿童及青少年
- B. 呈脐凹状丘疹
- C. 互样融合
- D. 可挤出白色乳酪样物质
- E. 一般无自觉症状

显示答案 正确答案:C

11. 对于梅毒血清试验中生物性假阳性反应，下列哪个是不正确的

- A. 生物性假阳性反应的孕妇所生的婴儿，不出现生物性假阳性反应
- B. 见于心拟脂抗原引起的反应
- C. 一般不发生于由密螺旋体抗原引起的反应
- D. 常见于全身性红斑狼疮

E. 生物学假阳性反应往往自然消失

显示答案 正确答案:A

12. 头癣治疗的金标准是口服

- A. 酮康唑
- B. 灰黄霉素
- C. 二性霉素
- D. 特比奈芬
- E. 氟康唑

显示答案 正确答案:B

13. 疥疮的传染是

- A. 人的疥疮只能人传染人
- B. 动物不长疥疮
- C. 动物和人都长疥疮，不相互传染
- D. 动物和人的疥疮可相互传染
- E. 动物和人的疥疮都是人疥螨传染

显示答案 正确答案:😊

14. 毛发红糠疹应与下列那种疾病鉴别

- A. 毛细血管扩张症
- B. 二期梅毒疹
- C. 银屑病
- D. 花斑癣
- E. 神经性皮炎

显示答案 正确答案:C

15. 甲癣最常见的类型为

- A. 近端甲下型
- B. 远端侧缘甲下型
- C. 白色浅表型
- D. 甲板内型
- E. 全甲毁损型

显示答案 正确答案:B

16. 血管性水肿最常发生部位

- A. 四肢
- B. 眼睑、口唇、外生殖器
- C. 手、足
- D. 躯干
- E. 头皮

显示答案 正确答案:B

17. 女性患者，40岁，于指背和掌面出现境界不清的皮损，角化明显，有浸润增厚，伴有皲裂，指甲变厚，冬重夏轻，考虑为

- A. 手癣
- B. 慢性湿疹
- C. 银屑病
- D. 接触性皮炎
- E. 手足口病

显示答案 正确答案:B

18. 痤疮最常见的皮损是

- A. 脓疱
- B. 结节
- C. 囊肿
- D. 炎性丘疹
- E. 盘状瘢痕

显示答案 正确答案:D

19. 艾滋病的癌瘤主要是

- A. 卡波西肉瘤
- B. 霍奇金病
- C. 鳞癌
- D. 基底细胞癌
- E. 湿疹样癌

显示答案 正确答案:A

20. 关于接触性皮炎正确的是

- A. 具有自限性
- B. 愈后不留色素沉着
- C. 无再发
- D. 均在较高浓度时才致病
- E. 无水疱形成

显示答案 正确答案:A

21. 下列哪一个是固定药疹的特征

- A. 斑贴试验可证实致敏药物
- B. 由光敏感所致
- C. 常对称发生
- D. 在同一部位可反复发生
- E. 剧烈瘙痒

显示答案 正确答案:D

22. 亚急性湿疹的表现哪项不正确

- A. 红肿减轻
- B. 以鳞屑、结痂为主

C. 可阵发性加重

D. 渗出增多

E. 皮损范围缩小

显示答案 正确答案:D

23. 接触性皮炎的组织病理叙述错误的是

A. 细胞内及细胞间水肿

B. 真皮浅层血管扩张

C. 血管周围淋巴细胞浸润

D. 慢性者棘层肥厚

E. 表皮突消失

显示答案 正确答案:E

24. 银屑病皮损好发于

A. 四肢伸侧

B. 面部

C. 四肢屈侧

D. 掌跖部

E. 阴囊

显示答案 正确答案:A

25. 扁平疣皮疹如经搔抓可沿抓痕呈串珠状排列，称

A. 皮肤划痕征

B. 同形反应

C. 尼氏征

D. Auspitz 征

E. Gottron 征

显示答案 正确答案:B

26. 下列哪一种是非特异性梅毒血清试验

A. TPI

B. RPR

C. TPHA

D. FTA-ABS

E. ELISA

显示答案 正确答案:B

27. 非淋菌性尿道炎主要感染原是

A. 链锁状杆菌

B. 葡萄球菌

C. 痘病毒

D. 乳头瘤病毒

E. 沙眼衣原体及支原体

显示答案 正确答案:E

28. 药疹的变态反应下列哪项正确

- A. 药物都是大分子物质，可有完全抗原作用
- B. 大多药物为低分子量化合物，也有抗原性
- C. 低分子量药物需在体内和蛋白质、多糖、多肽等载体结合，才能成为完全抗原
- D. 药疹无交叉过敏
- E. 药疹无多价过敏

显示答案 正确答案:C

29. 下列关于带状疱疹临床表现的叙述错误的是

- A. 典型症状发生之前常有轻度全身症状
- B. 在出现水疱之前数天可先有局部皮肤疼痛不适
- C. 皮疹沿神经走向呈带状排列
- D. 神经痛是本病的特征之一，皮疹消退后神经痛即消失
- E. 多见于胸背部、腰腹部，也可见于四肢、面部

显示答案 正确答案:D

30. 一婴儿，4个月大小时，于两侧耳后出现密集分布的粟粒大小丘疹，伴有小水疱，并逐渐出现渗出和糜烂，边界不清，最可能的诊断

- A. 急性湿疹
- B. 亚急性湿疹
- C. 慢性湿疹
- D. 耳部湿疹
- E. 郁积性湿疹

显示答案 正确答案:D

31. 急性湿疹的特点是

- A. 病变周围较重
- B. 皮损不融合
- C. 以丘疱疹为主
- D. 以瘙痒为主
- E. 久治不愈

显示答案 正确答案:C

32. 最常见的银屑病类型

- A. 红皮病型
- B. 脓疱型
- C. 关节病型
- D. 泛发型
- E. 寻常型

显示答案 正确答案:E

33. 银屑病转为泛发性脓疱型银屑病的最常见诱因是

- A. 应用皮脂类固醇或免疫抑制剂过程中突然停药
- B. 外用抗生素
- C. 内服抗组胺药
- D. 继发细菌感染
- E. 继发真菌感染

显示答案 正确答案:A

34. 下列有关传染性软疣的叙述哪项是不正确的

- A. 是一种传染性皮肤病
- B. 是一种由病毒引起的皮肤病
- C. 可通过直接接触传播、自身接种或性接触传播
- D. 典型皮疹为粟粒至黄豆大半球性丘疹，表面有蜡样光泽
- E. 治疗以口服抗病毒药物为主

显示答案 正确答案:E

35. 引起湿疹的主要因素有

- A. 外界刺激
- B. 过敏体质
- C. 气候条件
- D. 精神紧张
- E. 内分泌失调

显示答案 正确答案:B

36. 关于痤疮的日常护理哪项错误

- A. 避免使用含油脂及粉质过多的化妆品
- B. 少吃刺激性食物，多吃新鲜蔬菜等
- C. 挤捏
- D. 控制脂肪糖类饮食
- E. 常用温水洗涤患处

显示答案 正确答案:C

37. 可引起痤疮型药疹的药是

- A. 青霉素
- B. 链霉素
- C. 氯霉素
- D. 庆大霉素
- E. 雄激素

显示答案 正确答案:E

38. 引起药疹最多的药物是

- A. 抗组胺类
- B. 抗生素
- C. 糖皮质激素
- D. 性激素

E. 抗肿瘤药

显示答案 正确答案:B

39. 从发病机制看接触性皮炎是

- A. 速发型变态反应
- B. 免疫复合物反应
- C. 迟发型变态反应
- D. 细胞毒反应
- E. 超敏型反应

显示答案 正确答案:C

40. 胆碱能荨麻疹典型皮损

- A. 风团直径大小不等
- B. 风团直径 8~10mm，周围无红晕
- C. 风团直径 8~10mm，周围有一较小红晕
- D. 风团直径 2~3mm，周围无红晕
- E. 风团直径 2~3mm，周围有一较大红晕

显示答案 正确答案:E

41. 下列哪种疾病不是由病毒引起的

- A. 水痘
- B. 传染性软疣
- C. 手、足、口病
- D. 带状疱疹
- E. 花斑癣

显示答案 正确答案:E

42. 对慢性肥厚性皮损首选外用药为

- A. 湿敷
- B. 粉剂或振荡剂
- C. 振荡剂或乳剂
- D. 软膏或硬膏
- E. 酊剂或醑剂

显示答案 解题思路 正确答案:D

皮肤病外用药剂型选择的要点是水对水，油对油，慢性肥厚性皮损只能使用软膏和硬膏。

43. 尖锐湿疣的致病微生物

- A. 细菌
- B. 衣原体
- C. 支原体
- D. 病毒
- E. 不明

显示答案 正确答案:D

44. 女, 42岁, 外阴痒, 分泌物豆渣状, 分泌物涂片染色后可见假菌丝, 血糖化验是10. 2mmol / L, 最恰当的处理原则为

- A. 广谱抗生素
- B. 广谱抗生素+糖皮质激素
- C. 控制血糖+抗真菌治疗
- D. 抗真菌治疗
- E. 抗滴虫治疗

显示答案 正确答案:C

45. 强效外用糖皮质激素, 不宜长期外用

- A. 足跟
- B. 足背
- C. 阴股部
- D. 臀部
- E. 肩背

显示答案 正确答案:C

46. 手癣、足癣的病原菌为

- A. 细菌
- B. 衣原体
- C. 支原体
- D. 病毒
- E. 真菌

显示答案 正确答案:E

47. 银屑病(俗称牛皮癣)尽管患病率不低, 目前认为是一种

- A. 细菌感染, 抗生素可治疗的皮肤病
- B. 病毒感染, 抗病毒药可治疗的皮肤病
- C. 内分泌失调, 调节内分泌可治愈的皮肤病
- D. 原因不明, 尚无特效治疗药物的皮肤病
- E. 原因不明, 有各种西药或中药能根治的皮肤病

显示答案 正确答案:D

48. 治疗痤疮下列抗生素首选哪一种

- A. 先锋霉素4号
- B. 先锋霉素6号
- C. 庆大霉素
- D. 四环素
- E. 链霉素

显示答案 解题思路 正确答案:D

应用四环素治疗痤疮的优点: ①减少痤疮丙酸杆菌和表皮葡萄球菌数量; ②降低毛囊中游离脂肪酸浓度; ③增加前列腺素生成, 抑制一氧化氮合成酶, 增强过氧化物

歧化酶的表达。因此，四环素是首选抗生素。

49. 艾滋病的癌瘤主要为

- A. 卡波西肉瘤
- B. 鳞癌
- C. 霍奇金病
- D. 基底细胞癌
- E. 湿疹样癌

显示答案 正确答案:A

50. 艾滋病的各种感染主要在

- A. 肺、胃肠与神经系统
- B. 血液系统
- C. 肾脏
- D. 皮肤
- E. 心脏

显示答案 正确答案:A

51. 艾滋病可经过下列哪种途径传播

- A. 共用 1 个厕所
- B. 共用 1 个游泳池
- C. 共用餐具
- D. 共用注射器
- E. 以上都不对

显示答案 正确答案:D

52. 女，24岁，右足底行走时轻度疼痛，右足跖前部可见数个黄豆大小淡黄色角质栓，除去表面角质层可见有白色软刺状疣体，表面可见小黑点，最可能的诊断是

- A. 疙瘩
- B. 骯疬
- C. 跖疣
- D. 鸡眼
- E. 肢端疼痛症

显示答案 正确答案:C

53. 女，57岁，近2年发现颈部出现多发细长状突起疣体，如米粒大小，数目渐多，与皮肤颜色一致，最可能的诊断为

- A. 皮角
- B. 老年疣
- C. 丝状疣
- D. 扁平疣
- E. 瘢痕疙瘩

显示答案 正确答案:C

54. 女，22岁，面部皮疹2个月余，无自觉症状，皮疹为米粒大到绿豆大扁平隆起的丘疹，表面光滑！质硬，浅褐色，圆形、椭圆形或多角形，有的呈串珠状排列，可能的诊断为。

- A. 丝状疣
- B. 扁平疣
- C. 寻常疣
- D. 湿疹
- E. 老年疣

显示答案 正确答案:B

55. 带状疱疹的自觉症状为

- A. 有时瘙痒或疼痛
- B. 剧烈瘙痒
- C. 疼痛
- D. 无自觉症状
- E. 皮疹区麻木

显示答案 正确答案:C

56. 带状疱疹水疱的特征为

- A. 阵发性疼痛
- B. 瘙痒
- C. 持续性疼痛
- D. 无自觉症状
- E. 阵发性剧痒

显示答案 正确答案:A

57. 带状疱疹治疗的首选药物为

- A. 维生素B2
- B. 吗啉胍(病毒灵)
- C. 阿昔洛韦(无环鸟苷)
- D. 干扰素
- E. 抗生素

显示答案 正确答案:C

58. 胆碱能荨麻疹最可能发生的部位

- A. 躯干下部、下肢
- B. 躯干上部、上肢
- C. 头面
- D. 眼睑、唇
- E. 手足

显示答案 正确答案:B

59. 导致带状疱疹的病毒名称做

- A. 羊痘一带状疱疹病毒

- B. 单纯疱疹—带状疱疹病毒
- C. 水痘—带状疱疹病毒
- D. 天花—带状疱疹病毒
- E. 乳头瘤—带状疱疹病毒

显示答案 正确答案:C

60. 导致带状疱疹的病原微生物为

- A. 衣原体
- B. 细菌
- C. 支原体
- D. 病毒
- E. 弓形虫

显示答案 正确答案:D

61. 典型的神经性皮炎皮疹为

- A. 边缘清楚的红斑鳞屑性皮疹
- B. 浸润性斑块，基底较硬
- C. 片状苔藓样变
- D. 边缘清楚的红斑丘疹
- E. 边缘不清浸润和色素脱失

显示答案 正确答案:C

62. 酊剂为

- A. 不挥发的药物溶于酒精
- B. 药物溶于水中
- C. 挥发性的药物溶于酒精
- D. 油中水剂
- E. 粉剂加在凡士林中

显示答案 正确答案:A

63. 对痤疮瘢痕治疗无效的为

- A. 糖皮质激素局封
- B. 磨削术
- C. 激光
- D. 口服抗生素药物
- E. 美容手术

显示答案 正确答案:D

64. 对固定性药疹下列哪一项是不恰当的

- A. 是特定药物引起的药疹
- B. 停服致敏药物后可以痊愈
- C. 边界清楚的红斑
- D. 经常发作可使病变数增加
- E. 有水疱发生

显示答案 正确答案:A

65. 对于痤疮的日常护理哪项不正确

- A. 控制脂肪糖类饮食
- B. 少吃刺激性食物，多吃新鲜蔬菜等
- C. 挤捏
- D. 避免使用含油脂及粉质过多的化妆品
- E. 常用温水洗涤患处

显示答案 正确答案:C

66. 对于痤疮以下哪种说法不对

- A. 只有青年人才发病
- B. 可造成多种形态的损害
- C. 发病与多种因素有关
- D. 常反复发作持续数年
- E. 可有婴儿痤疮

显示答案 正确答案:A

67. 对于急性期伴有渗出的皮炎湿疹类损害，应首选哪种治疗

- A. 软膏制剂
- B. 煤焦油制剂
- C. 封包治疗
- D. 湿敷加油剂或糊剂
- E. 洗剂

显示答案 正确答案:D

68. 对于结节性痤疮及囊肿性痤疮哪项不正确

- A. 不易消退
- B. 多见于女性
- C. 多见于男性
- D. 愈后遗留萎缩性或增生性瘢痕
- E. 继发细菌感染时皮损红肿明显、有压痛

显示答案 正确答案:B

69. 对于老年性瘙痒病的预防以下叙述不正确的为

- A. 尽量避免搔抓
- B. 老年患者洗澡不宜过勤
- C. 尽量用热水洗烫患部
- D. 避免用碱性过强的肥皂
- E. 避免刺激性饮食

显示答案 正确答案:C

70. 对于老年性瘙痒病的治疗不正确的为

- A. 可根据病情选用含止痒剂的炉甘石洗剂、皮质激素软膏和霜剂

- B. 使用性激素治疗可能有一定疗效
- C. 可口服抗组胺药
- D. 继发湿疹样变或苔藓样变者禁用皮质激素制剂
- E. 可口服镇静催眠药

显示答案 正确答案:D

71. 对于老年性瘙痒病以下叙述不正确的为

- A. 瘙痒一般为阵发性，严重者可表现为持续性瘙痒
- B. 瘙痒以颈肩部为主
- C. 多由于皮脂腺功能减退，皮肤干燥和退行性萎缩等因素引起
- D. 继发损害可见抓痕、血痂及肥厚
- E. 使用性激素治疗可能有一定疗效

显示答案 正确答案:B

72. 对于梅毒血清试验中生物性假阳性反应，下列哪个是不恰当的

- A. 生物性假阳性反应的孕妇所生的婴儿，不出现生物性假阳性反应
- B. 一般不发生于由密螺旋体抗原引起的反应
- C. 见于心拟脂抗原引起的反应
- D. 常见于全身性红斑狼疮
- E. 生物学假阳性反应往往自然消失

显示答案 正确答案:A

73. 对于瘙痒症以下叙述不恰当的为

- A. 某些物理、化学刺激及药物也可引起该病的发生
- B. 病因繁多，常与某些系统性疾病有关
- C. 临幊上仅有瘙痒症状而无原发性皮肤损害的皮肤病
- D. 临幊上很少见到继发皮损
- E. 积极寻找原发病因并进行相应的治疗，是预防该病的关键

显示答案 正确答案:D

74. 对于银屑病叙述，不恰当的为

- A. 肘膝对称发生
- B. 好发于四肢伸侧
- C. 皮疹特点：银白色鳞屑、薄膜现象、点状出血
- D. 病程慢性
- E. 多为冬轻夏重

显示答案 正确答案:E

75. 对于银屑病治疗的注意事项，不恰当的为

- A. 对于进行期皮损，禁用刺激性强的药物
- B. 追求彻底治愈，可全身使用糖皮质激素
- C. 避免诱发因素
- D. 应针对不同病因、类型、病期给药
- E. 局限性皮损，以局部外用药为主

显示答案 正确答案:B

76. 二期梅毒的皮疹是下列那一种

- A. 尖锐湿疣
- B. 扁平湿疣
- C. 软下疳
- D. 树胶肿
- E. 结节性梅毒疹

显示答案 正确答案:B

77. 非淋菌性尿道炎主要感染原为

- A. 葡萄球菌
- B. 链锁状杆菌
- C. 痘病毒
- D. 乳头瘤病毒
- E. 沙眼衣原体及支原体

显示答案 正确答案:E

78. 粉剂的主要基质组成不包括

- A. 药物
- B. 氧化锌
- C. 滑石粉
- D. 淀粉
- E. 炉甘石

显示答案 正确答案:E

79. 风团形成的主要因素

- A. 毛细血管充血
- B. 毛细血管扩张
- C. 毛细血管增多
- D. 炎症
- E. 真皮浅层急性水肿

显示答案 正确答案:E

80. 感染梅毒后第一期皮肤病变出现的时间为

- A. 一个月
- B. 1周
- C. 3周
- D. 3日
- E. 4周

显示答案 正确答案:C

81. 糊剂为

- A. 粉剂加在酒精中

- B. 油中水剂
- C. 粉剂加在凡士林中
- D. 粉剂加橄榄油或花生油
- E. 药物溶于水中

显示答案 正确答案:C

82. 黄癣造成头发
- A. 1~2mm 处折断
 - B. 2~4mm 处折断
 - C. 暂时性脱发
 - D. 永久性脱发
 - E. 对头发无影响

显示答案 正确答案:D

83. 接触过敏性皮炎致敏的抗原呈递细胞为
- A. 棘细胞
 - B. 角质形成细胞
 - C. 颗粒细胞
 - D. 基底细胞
 - E. 朗格罕斯细胞

显示答案 正确答案:E

84. 疥疮的传染为
- A. 动物和人都长疥疮，不相互传染
 - B. 动物不长疥疮
 - C. 人的疥疮只能人传染人
 - D. 动物和人的疥疮可相互传染
 - E. 动物和人的疥疮都是人疥螨传染

显示答案 正确答案:D

85. 抗组胺药、肾上腺素，必要时用激素常用于哪种水肿
- A. 经前紧张征的水肿
 - B. 营养不良性水肿
 - C. 局部炎症性水肿
 - D. 血管神经性水肿
 - E. 黏液性水肿

显示答案 正确答案:D

86. 慢性肥厚炎症性皮损应选择
- A. 乳剂、振荡剂
 - B. 水剂、酊剂
 - C. 粉剂、水剂
 - D. 水剂、振荡剂、油剂
 - E. 软膏、糊膏、硬膏

[显示答案](#) 正确答案:E

87. 慢性荨麻疹不宜使用

- A. 维生素 C
- B. 皮质类固醇激素
- C. 抗组胺药
- D. 胎盘组织液
- E. 氨茶碱

[显示答案](#) 正确答案:B

88. 慢性生物性假阳性反应的梅毒血清试验，发生最高的是下列哪一种疾

病

- A. 麻风
- B. 荨麻疹
- C. 系统性红斑狼疮
- D. 猩红热
- E. 慢性风湿性关节炎

[显示答案](#) 正确答案:C

89. 慢性湿疹最需与下列哪种疾病鉴别

- A. 荨麻疹
- B. 慢性单纯性苔藓
- C. 急性湿疹
- D. 特应性皮炎
- E. 药疹

[显示答案](#) 正确答案:B

90. 毛发红糠疹应与下列哪种疾病鉴别

- A. 花斑癣
- B. 一期梅毒疹
- C. 银屑病
- D. 毛细血管扩张症
- E. 神经性皮炎

[显示答案](#) 正确答案:C

91. 皮肤色素痣哪种情况应进行手术

- A. 破溃及出血
- B. 颜色加深，痣增大
- C. 易受摩擦或外伤部位的痣
- D. 区域淋巴结增大
- E. 以上都是

[显示答案](#) 正确答案:E

92. 强效外用糖皮质激素不宜长期外用

- A. 面部
- B. 后背
- C. 足背
- D. 足跟
- E. 臀部

显示答案 正确答案:A

93. 全身性皮肤瘙痒中，下列哪项是恰当的

- A. 甲状腺功能低下者一般不会出现皮肤瘙痒
- B. 急性肾炎皮肤瘙痒剧烈
- C. 霍奇金病的瘙痒是发病的最初症状
- D. 糖尿病性瘙痒常与空腹血糖成正比
- E. 黄疸引起皮肤瘙痒者与皮肤中的胆盐浓度不平行

显示答案 正确答案:C

94. 人工荨麻疹

- A. 皮肤划痕征阳性
- B. 以小冰块置患者前臂屈面作激发试验阳性
- C. 被动转移试验阳性
- D. 运动后发生
- E. 接触热水后

显示答案 正确答案:A

95. 日光性荨麻疹，下列哪项波长紫外线敏感作用最强

- A. 波长 350nm 左右
- B. 波长 250nm 左右
- C. 波长 300nm 左右
- D. 波长 200nm 左右
- E. 波长 400nm 左右

显示答案 正确答案:C

96. 乳剂的主要作用不包括

- A. 消炎
- B. 滋润
- C. 干燥
- D. 保护
- E. 止痒

显示答案 正确答案:C

97. 神经性皮炎的典型皮肤损害为

- A. 片状苔藓样变
- B. 边缘清楚的红斑鳞屑性损害
- C. 浸润性斑块，基底较硬
- D. 边缘清楚的红斑丘疹

E. 边缘不清楚的色素增加和色素脱失

显示答案 解题思路 正确答案:A

神经性皮炎的皮肤损害特点就是皮肤片状苔藓样变，皮肤变厚，皮沟深，皮丘隆起，其他均不是神经性皮炎的特征。

98. 神经性皮炎的皮疹特征为

- A. 糜烂流水伴痒
- B. 丘疹结节伴痒
- C. 片状苔藓样变伴痒
- D. 红斑丘疹伴痒
- E. 无任何自觉症状

显示答案 正确答案:C

99. 湿疹症状的特点为

- A. 多形性皮疹，有渗出倾向，对称分布，瘙痒明显，易复发
- B. 四肢伸侧为主，轻痒，伴银白色脱屑
- C. 皮疹为风团，发生及消退迅速，消退后不留痕迹
- D. 以脱屑为主，开始即有苔藓化表现，痒明显
- E. 皮损局限于某一部位，边界清楚，痒不明显，有自限性

显示答案 正确答案:A

100. 手癣、足癣的病原微生物为

- A. 衣原体
- B. 细菌
- C. 支原体
- D. 病毒
- E. 真菌

显示答案 正确答案:E

(四) 皮肤中级考试的参考用书

1, 《皮肤性病学》 人民卫生出版社 主编张学军

教材全部要细看，虽然考试大大超教材，但教材很重要，有的细节就是教材上的。

2, 《临床皮肤病学》 江西科学技术出版社 主编赵辩

这本书是很多学校的考研用书，中级考试自然少不了它了。临皮的总论要细看，基础和免疫考的很多而且是这上面的，病有几百种要结合考试大纲看各论，有的东西教材上根本没有，所以看这本很有必要。

3，《全国卫生专业技术资格考试指导 皮肤与性病学》人民卫生出版社

如果你实在没时间也没耐心看书那就看这本吧，如果看对考试也很有帮助的，但是不要买盗版，盗版太多错别字如果为这个把分丢了就太郁闷了。

在看书的过程中你会莫名其妙，因为有的数据三本都不同，我是以教材为准。