


[www.mediskin.cn](http://www.mediskin.cn)

# 水疱型足癬



• **足癣**俗名“香港脚”，又叫脚气、脚湿气，是发生于掌、跖与指、趾间皮肤的浅部真菌感染。由于真菌很容易通过接触感染，因此公共浴池、浴巾、鞋子等容易成为病菌传播途径。足癣分为三种类型，**水**

**疱型足癣**是常见的一种：

# 概述：

- **水疱型足癣**是一种临床极为常见的发生于足部的皮肤癣疾。由致病性丝状真菌感染引起。临床可分为角化型、水疱型、丘疹鳞型、间擦型和体癣型等数种，也可混合出现。有传染倾向。





# 水疱型手足癣症状：

- ①足底出现**水疱**，甚至几个水疱融合成较大的水疱，边界清楚，皮肤不红，疱破脱屑。数日后干燥脱屑，相互融合形成多房性水疱，
- ②**剧痒**，必须抓破为止。故常伴有继发感染，致局部化脓、红肿、疼痛，撕去疱壁，可见蜂窝状基底及鲜红色糜烂面。



# 水疱型手足癣治疗

- 水疱型手足癣患者在治疗上需要注意，无论何种药物治疗癣病，均需一定的疗程。
- 至于治疗所需要的时间，甲癣需用12周以上，手癣4~6周，这是由真菌的生长繁殖规律和皮肤、指(趾)甲的生长速度、代谢过程决定的。

- 水疱型足癣的治疗一般有两种，
  - 一是外用抗真菌药物；
  - 二是内服抗真菌药加外用抗真菌药物的联合治疗方法
- 一般程度较轻的足癣，如新发病时，往往在足趾部起少许水疱伴有瘙痒，或较轻的趾间糜烂型和角化型足癣，可以外用抗真菌药物，如足.净.膏



【瓶子和外包装】





# 水疱型手足癣预防有道

- 除治愈自身的癣病外，还应动员家庭成员同时防治，因为癣病可以通过直接接触患者或污物互相传染。
- 养成不与别人共用毛巾、面盆、鞋袜、洗脚盆等不良卫生习惯。
- 经常清洗手足，勤换鞋袜，所穿鞋袜的透气性应好，勤洗勤晒。